

Producto:	Banvel®
Negocio:	Protección de Cultivos
Clase de Producto:	HERBICIDAS

Banvel®

Información Técnica:	BANVEL ® Puede ser usado solo o mezcla con otros herbicidas sobre diferentes cultivos en distintos estados de desarrollo, de acuerdo a las recomendaciones de uso. BANVEL ® se absorbe por hojas y raíces translocándose a todos los órganos de la planta, controlando totalmente la maleza.
Información General:	BANVEL ® es un herbicida post-emergente que controla malezas de hoja ancha resistentes al 2,4 D o MCPA.
Plagas:	Abrojo, Altamisa, Bejuco, Bolsa de pastor, Camambú, Capiquí, Cardo asnal, Cebollín, Chamico, Enredadera anual, Lengua de vaca, Manzanilla, Manzanilla cimarrona, Mostacilla, Nabo, Nabón, Ortiga, Quinoa, Saetilla, Sanguinaria o Cien nudos, Sunchillo o Yuyo sapo, Verdolaga, Violeta silvestre, Yuyo colorado o Ataco, Cardo pendiente, Falsa biznaga, Alfilerillo, Abrepuño amarillo, Morenita, Cardo ruso, Paiquito, Flor amarilla, Mostaza negra, Rabizón, Tupulo, Afata, Rama negra, Verbena, Chañar, Tusca, Duraznillo negro, Flor de Santa Lucía
Cultivos:	Trigo, Barbecho químico, caña de azúcar, Cebada, lino, pasturas, sorgo, mijo, pasturas de gramíneas, Maíz
Componentes:	Dicamba

- Características
- Compatibilidad de Cultivos M. Ambiente P.
- Auxilios
- Plagas
- Restricciones
- Usos Ventajas

Características

BANVEL ® es un herbicida post-emergente que controla malezas de hoja ancha resistentes al 2,4 D o MCPA. Puede ser usado solo o mezcla con otros herbicidas sobre diferentes cultivos en distintos estados de desarrollo, de acuerdo a las recomendaciones de uso. BANVEL ® se absorbe por hojas y raíces traslocándose a todos los órganos de la planta, controlando totalmente la maleza.

Trigo
Cebada
Cereales de invierno
Maíz
Sorgo
Mijo
Lino
Pasturas de gramíneas y campos de pastoreo
Caña de azúcar

Dosis	Epoca de aplicacion
BANVEL ® 100-150 cc + 2,4 D 240-320 cc (Esterbutírico 100%)	Desde el inicio al fin del macollaje
BANVEL ® 100-150 cc + MCPA 700-1000cc (Sal sódica 28%)	Desde la 4° hoja hasta el fin del macollaje
BANVEL ® 100-150 cc + Bromoxynil 750-1200 cc	Desde la 2° o 3° hoja hasta el fin del macollaje
BANVEL ® 150- 200 cc .	Desde la 2° o 3° hoja hasta el fin del macollaje pero en ausencia de malezas crucíferas (nabo, nabón, mostacilla).

Dosis	Epoca de aplicacion
BANVEL ® 150- 200 cc + 2,4 D 240-320 cc (Esterbutírico 100%)	En cobertura total sobre el cultivo desde la 2° hoja hasta la 8° hoja del cultivo. Equipos con caños de bajada: Desde la 8°hoja hasta floración.

Dosis	Epoca de aplicacion
BANVEL ® 80- 100 cc + MCPA 700-1000cc (Sal sódica 28%)	Desde los 4 pares de hojas, hasta los 8 pares.

Dosis	Epoca de aplicacion
BANVEL ® 150-200 cc + 2,4 D 240-320 cc (Ester butírico 100%)	En todos los casos realizar los tratamientos con malezas pequeñas (2 a 4 hojas), y las rosetas con menos de 10 cm de diámetro, y siempre en activo crecimiento.

Malezas	Dosis	Epoca de aplicacion
<p>TUPULO (Sicyos poliacanthus) , YUYO COLORADO O ATACO (Amaranthus sp.), FLOR DE SANTA LUCIA (Commelina virginica), SUNCHILLO O YUYO SAPO*(Wedelia glauca), ALTAMISA (Ambrosia tenuifolia), AFATA (Sida rhombifolia), RAMA NEGRA (Conyza bonaeriensis), VERBENA (Verbena intermedia), BEJUCO* (Ipomoea sp.), SAETILLA* (Bidens pilosa), CEBOLLIN O CHUFA (Cyperus).</p>	<p>BANVEL ® 200- 400 cc + 2,4 D sal amina 72% 1040-2080 cc/ha.</p>	<p>Desde el inicio del macollaje del cultivo hasta la aparición de los primeros canutos. Malezas pequeñas, creciendo activamente.</p>