

<b>Producto:</b>	<b>Envoke</b>	
Negocio:	Protección de Cultivos	
Clase de Producto:	HERBICIDAS	

Información Técnica:	ENVOKE ® debe ser aplicado con condiciones adecuadas para el activo crecimiento de las malezas. Condiciones como estrés hídrico, bajas temperaturas, baja fertilidad o daños por plagas y/o enfermedades, pueden reducir la actividad de ENVOKE ® sobre las malezas, especialmente en algunas ciperáceas.
Información General:	ENVOKE ® es un herbicida postemergente selectivo, para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas y ciperáceas en el cultivo de algodón. ENVOKE ® se absorbe a través de las hojas y las raíces, siendo traslocado rápidamente hacia las zonas de crecimiento, donde actúa inhibiendo el desarrollo de las malezas. ENVOKE ® puede ser utilizado en todos los sistemas de labranza del cultivo de algodón, desde siembra directa hasta convencional.
Plagas:	Abrojo grande, Amor seco, Bejuco, Cebollín, Chinchilla, Junquillo, Sorgo de Alepo de semilla, Torito, Afata
Cultivos:	Algodón
Componentes:	trifloxysulfurón

- Características
- Compatibilidad
- Cultivos M.
- Ambiente P.
- Auxilios Plagas
- Restricciones
- Usos Ventajas

## GENERALIDADES

**ENVOKE** ® es un herbicida postemergente selectivo, para el control de malezas de hoja ancha y algunas gramíneas y ciperáceas en el cultivo de algodón.

**ENVOKE** ® se absorbe a través de las hojas y las raíces, siendo traslocado rápidamente hacia las zonas de crecimiento, donde actúa inhibiendo el desarrollo de las malezas.

**ENVOKE** ® puede ser utilizado en todos los sistemas de labranza del cultivo de algodón, desde siembra directa hasta convencional.

**ENVOKE** ® debe ser aplicado con condiciones adecuadas para el activo crecimiento de las malezas. Condiciones como estrés hídrico, bajas temperaturas, baja fertilidad o daños por plagas y/o enfermedades, pueden reducir la actividad de **ENVOKE** ® sobre las malezas, especialmente en algunas ciperáceas.

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS	MALEZAS

**ALGODÓN**

**Post-emergencia temprana :**  
aplicar cuando el cultivo se encuentra con 4 a 8 hojas.

**Malezas de hoja ancha**  
:entre dos y cuatro hojas(5-8 cm de altura)

10 g/ha

Xanthium cavanillesii  
(abrojo grande)

Acanthospermum hispidum ( Torito )

Ipomoea nil ( Bejuco, Enredadera )

Bidens subalternans  
(Amor seco)

Cyperus iria ( Junquillo )

Flaveria bidentis  
( Balda )

Tagetes minuta  
(Chinchilla)

**Control del 80 %**

Ipomoea grandifolia  
(Bejuco, Campanilla)

Ipomoea purpurea  
(bejuco, Campanilla)

Cassia  
occidentalis o  
Senna  
occidentalis (   
Cafetillo )

Cassia tora o  
Senna obtusifolia

( Porotillo )

**Control parcial:**

Malvastrum  
coromandelianum  
(Afata floja )

Cyperus rotundus  
( Cebollín )

Sorghum  
halepensis (de  
semilla) (Sorgo  
de alepo)

Tribulus terrestris  
(Roseta francesa  
)

**MALEZAS**

Xanthium cavanillesi (abrojo grande)

Acanthospermum hispidum (orito)

Ipomoea nil ( ejuco, Enredadera)

Bidens subalternans (Amor seco)

Cyperus iria (Junquillo)

Flaveria bidentis (Balda)

Tagetes minuta (Chinchilla)

**Control del 80 %**

Ipomoea grandifolia (Bejuco,  
Campanilla)

Ipomoea purpurea (bejuco,  
Campanilla)

Cassia occidentalis o Senna  
occidentalis (Cafetillo)

Cassia tora o Senna obtusifolia  
(Porotillo)

**Control parcial:**

Malvastrum coromandelianum (Afata  
floja )

Cyperus rotundus (Cebollín)

Sorghum halepensis (de semilla)  
(Sorgo de alepo)

Tribulus terrestris (Roseta francesa )