


Producto: TASPА®	
Negocio: Protección de Cultivos	
Clase de Producto: FUNGICIDAS	

Información Técnica:	TASPА ® es un nuevo fungicida de acción sistémica del grupo de los triazoles. Provee una acción preventiva duradera y una acción curativa contra una amplio rango de enfermedades presentes en los cultivos de papa, maní , trigo, avena , cebada y soja.
Información General:	Fungicida sistémico preventivo y curativo. Significa más y mejores rendimientos
Plagas:	Complejo de enfermedades de fin de ciclo en soja, Mancha marrón o Septoria en soja, Tizón de la hoja y Mancha púrpura de la semilla de soja, Tizón del tallo y de la vaina en soja, Tizón temprano de la papa, Viruela tardía del maní, Viruela temprana del maní, Roya de Soja
Cultivos:	Maní, Papa, Soja
Componentes:	Difenoconazole, Propiconazole

<ul style="list-style-type: none"> Características Compatibilidad Cultivos M. Ambiente P. Auxilios Plagas Restricciones Usos Ventajas 	<h3>Características</h3> <p>TASPА ® es un nuevo fungicida de acción sistémica del grupo de los triazoles. Provee una acción preventiva duradera y una acción curativa contra una amplio rango de enfermedades presentes en los cultivos de papa, maní y soja.</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CULTIVO</th> <th>ENFERMEDAD</th> <th>DOSIS (l/ha)</th> <th>MOMENTO DE APLICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">MANI</td> <td>Viruela temprana (Cercosporia Arachidicola)</td> <td rowspan="2">0,2-0,25*</td> <td rowspan="2">A la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 14 a 21 días. (1)</td> </tr> <tr> <td>Viruela tardía (Cercosporidium Personatum)</td> </tr> </tbody> </table>	CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (l/ha)	MOMENTO DE APLICACION	MANI	Viruela temprana (Cercosporia Arachidicola)	0,2-0,25*	A la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 14 a 21 días. (1)	Viruela tardía (Cercosporidium Personatum)
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (l/ha)	MOMENTO DE APLICACION							
MANI	Viruela temprana (Cercosporia Arachidicola)	0,2-0,25*	A la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 14 a 21 días. (1)							
	Viruela tardía (Cercosporidium Personatum)									

PAPA	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)**	0,2-0,25**	A la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 14 días.
SOJA	Complejo tardío o enfermedades de fin de ciclo: Mancha marrón de la soja (<i>Septoria glycines</i>)	0,15	Realizar una primera aplicación con el cultivo en R3, repitiendo si es necesario en R5 – R6.
	Mancha púrpura de la semilla (<i>Cercospora kikuchi</i> , <i>Cercospora sojina</i>)		
	Tizón del tallo y de la vaina (<i>Phomopsis sojiae</i>)		
	Roya de la soja (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	0,15	Aplicar al observar los primeros síntomas. Realizar una segunda aplicación a los 14 días en caso que la presión de la roya continúe.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (l/ha)	MOMENTO DE APLICACION
	Viruela temprana		A la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 14 a 21 días. (1)

MANI	(Cercosporia Arachidicola) Viruela tardía (Cercosporidium Personatum)	0,2-0,25*	
PAPA	Tizón temprano (Alternaria solani)**	0,2-0,25**	A la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 14 días.
SOJA	Complejo tardío o enfermedades de fin de ciclo: Mancha marrón de la soja (Septoria glycines)	0,15	Realizar una primera aplicación con el cultivo en R3, repitiendo si es necesario en R5 - R6.
	Mancha púrpura de la semilla (Cercospora kikuchi, Cercospora sojina) Tizón del tallo y de la vaina (Phomopsis sojae)		
	Roya de la soja (Phakopsora pachyrhizi)		0,15