

ALIETTE

Funguicida



Información Adicional



[Marbete](#)



[Hoja de Seguridad](#)

Modo de Acción

Sistémico. El producto tiene actividad sistémica ascendente y descendente. Esta particularidad le da una gran movilidad dentro de la planta y le permite dar protección al nuevo follaje y su desarrollo. Actúa preventiva y curativamente, inhibiendo la germinación de las esporas o bloqueando el desarrollo del micelio de numerosos hongos y especialmente los Fycomicetes (Plasmopara, Phitophthora, Bremia, etc.)

Grupo Químico

Fosfito metálico

Principio Activo

Fosetil Aluminio

Formulación

WG (Gránulos dispersables) y SP (Polvo soluble). Concentración:

Toxicología

Producto que normalmente no ofrece peligro: Clase IV. Antídoto: No tiene antídoto conocido. En caso de intoxicación se debe aplicar tratamiento sintomático. Principio activo DL 50 oral aguda en ratas: 7080 mg/kg, DL 50 dermal aguda en ratas: > 2000 mg/kg, DL 50 inhalatoria aguda en ratas: > 5,11 mg/l. Producto formulado. DL 50 oral aguda en ratas: 2860 mg/kg. DL 50 dermal aguda en ratas: >2020 mg/kg. DL 50 inhalatoria aguda en ratas: > 5,02 mg/l.

Presentación por cantidad

Caja de 12 x 1 kg

Ventajas y resultados

- Efecto preventivo y curativo.
- Prolongado efecto residual.
- Acción sistémica completa.
- Fácil aplicación.

Modo de preparación

Puede ser utilizado tanto en aplicaciones foliares como también pintando el tronco de los árboles afectados. En este caso se debe preparar una solución de 400 g en 1 l de agua. Las aplicaciones foliares deben hacerse con un caudal de agua por planta que permita un buen mojado

pero evitando el goteo. En el caso de que las plantas afectadas sean aisladas es aconsejable tratarlas individualmente con la precaución de aplicar también el tratamiento a las plantas vecinas para evitar la propagación de la enfermedad.