

## CONNECT

Insecticida



### Información general

- **Connect®** es un producto que combina la acción insecticida del Imidacloprid y del Beta-ciflutrin, logrando el mejor resultado en el control de plagas.
- Su formulación en base a dos activos de distinta familia lo hace un producto ideal para evitar posibles resistencias.

### Plagas

Cultivo	Dosis	Plaga	Momento de aplicación
	500 cc/ha	<b>Trips</b> ( <i>Caliothrips phaseoli</i> )	75% de las hojas del estrato inferior con síntomas de daño **
Soja	750 cc/ha	<b>Chinche de los cuernitos</b> ( <i>Euchistus heros</i> ) <b>Oruga de las leguminosas</b> ( <i>Anticarsia gemmatilis</i> ) Chinche de la alfalfa ( <i>Piezodorus guildinii</i> ) <b>Chinche verde</b> ( <i>Nezara viridula</i> ) <b>Alquiche chico</b> ( <i>Edessa mediatubunda</i> ) <b>Isoca medidora</b> ( <i>Rachiplusia nu</i> )	Aplicar cuando se alcance el umbral.

### Presentación

Bidón x 5 Lts.

### Composición

Suspensión concentrada (SC)

**Beta cyfluthrin:** ciano - (4 - fluoro - 3 fenoxifenil ) - metil- 3 - (2,2 - dicloroetenil)- 2,2- dimetil - Ciclopropanocarboxilato  
 1,25 g

**Imidacloprid:** 1-(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl>-N-nitro-2-imidazolidinimine (C.A.)  
 10 g  
**solvente y emulsionante c.s.p** 100 cm<sup>3</sup>

## Recomendaciones de uso

- \*\* Agregar 500 ml/ha de aceite mineral para aplicaciones terrestres y 1000 ml/ha para aplicaciones aéreas. En ambos casos, el aceite debe ser agregado al tanque posteriormente a la carga de Connect.
- Es necesario lograr un buen mojado de toda la planta, ya que esta especie se concentra mayormente en el estrato inferior del cultivo, y en el envés de los foliolos.
- Se recomienda, en aplicaciones terrestres, volúmenes de caldo de 120 a 150 l/ha dependiendo del follaje y la densidad del cultivo. Elegir velocidades de avance moderadas para evitar un excesivo movimiento del botalón, lo que lleva a una mala distribución de las gotas en los diferentes estratos.
- En aplicaciones aéreas utilizar 15 l/ha de caldo.
- Aplicar cuando se llegue al umbral que se detalla a continuación:

Plaga	R3-R4	R5
Chinche verde	0,8 □ 1 chinche/metro	2 chinches/metro
Chinche de la alfalfa	0,5 □ 0,7 chinches/metro	1 chinche/metro
Alquiche chico	0,8 □ 1 chinche/metro	2 chinches/metro
Chinche de los cuernitos	0,5 □ 0,7 chinches/metro	1 chinche/metro
Oruga de las leguminosas	*	**
Isoca medidora	**	**

\* **Oruga de las leguminosas:** Antes de floración: cuando se observen 15- 20 orugas mayores de 0,5 cm por metro lineal de surco a 70 cm y 35 % de defoliación.

\*\* **Oruga de las leguminosas e Isoca medidora:** De floración en adelante: cuando se observan 10 orugas/ metro lineal de surco a 52 cm y más de 10 % de defoliación.

## Ventajas y Resultados

- Producto con amplio espectro de acción (chinchas, orugas, trips).
- Mayor persistencia (posee el mayor poder residual del mercado)
- Dos modos de acción diferentes.
- Mayor selectividad a los enemigos naturales.

### **Clase toxicológica**

- **CLASE III. Poco peligroso**