

PREVICUR

Funguicida



Información Adicional

Modo de Acción

Sistémica con acción fungistática. Es absorbido por las raíces. Actúa sobre hongos ficomicetes (Pythium, Phytophthora, Peronospora, Pseudoperonospora y Bremia), que atacan raíces, cuello, base del tallo y hojas. Posee un triple modo de acción: Reduce el crecimiento del micelio. Actúa como antiesporulante. Influye en el metabolismo del hongo, reduciendo la propagación de la enfermedad y localizando la infección.

Grupo Químico

Carbamato

Principio Activo

Propamocarb

Formulación

LS (Concentrado soluble). Concentración: 72,2%

Toxicología

Producto poco peligroso: Clase III. Antídoto: Atropina. Principio activo: DL 50 oral aguda en rata: 2000 - 8550 mg/kg. DL 50 dermal aguda en rata: 3000 mg/kg. CL 50 inhalatoria aguda en rata: > 7,9 mg/m³. Del producto formulado: DL 50 oral aguda en rata hembra: > 2000 mg/kg. DL 50 dermal aguda en ratas: > 5000 mg/kg. CL 50 inhalatoria aguda en rata: > 7,9 mg/m³.

Presentación por cantidad

Caja (10 x 1 lt). Caja (4 x 5 lt)

Mezclas y restricciones

Puede ser mezclado con otros productos, salvo los de reacción alcalina. Evitar también la mezcla con fertilizantes y reguladores de crecimiento. Para las mezclas de tanque, se aconseja disolver primero en agua la cantidad requerida.

Ventajas y resultados

Es absorbido por la planta. No se lava con la lluvia. Formulación de fácil manejo. Producto de baja toxicidad. No tiene limitación en el número y momento de aplicación.

Modo de preparación

Es absorbido por las raíces, por lo que debe ser aplicado con el suelo húmedo o posterior a un riego, para lograr una buena profundización del producto hasta la zona radical.