

## TELDOR

Funguicida



### Información Adicional

### Información general

Teldor® 50 WG es un fungicida de contacto eficaz para el control de Botrytis cinerea

### Plagas

Cultivo	Enfermedad	Dosis	PC	Momento de Aplicación
Vid	Podredumbre gris de la vid ( <b>Botrytis cinerea</b> )	100gr/100 lts de agua	3 días	De acuerdo a las condiciones predisponentes reinantes, se recomiendan aplicaciones en FLORACIÓN, CIERRE DE RACIMO Y ENVERO para luego y, en caso de ser necesario hacer aplicaciones adicionales según las condiciones antes mencionadas.
Frutilla		150gr/100 lts de agua	3 días	Las aplicaciones deben comenzar a partir del inicio de la floración, debiendo ser continuadas cada 15 a 21 días y de acuerdo a las condiciones predisponentes para el

				desarrollo de la enfermedad.
--	--	--	--	------------------------------

## Composición

**fenhexamid:** 1-Metil- ácido ciclohexano carboxílico  
(2,3-dicloro-4-hidroxi-fenil) - amida ..... 50 gr  
**inertes, c.s.p** ..... 100 gr

## Recomendaciones de uso

Llene el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua limpia. Con el agitador en movimiento vierta la cantidad recomendada de **Teldor® 50 WG** y complete el tanque con agua.

**Teldor® 50 WG** puede ser aplicado tanto con equipos terrestres como con mochilas de espalda.

Se recomienda aplicar hasta alcanzar el □ punto de goteo □; para lo cual los caudales a aplicar no varían de los tradicionalmente usados para los cultivos que se recomienda en el cuadro a continuación descripto.

**Como política para el manejo de resistencias, se recomienda rotar con productos de diferente grupo químico y/o modo de acción. En este caso, es recomendado el uso de Folicur® 43 SC.**

**Teldor® 50 WG**, es perfectamente fitocompatible con los cultivos para los cuales está recomendado.

## Modo de acción

**Teldor® 50 WG** es un fungicida de contacto

## Clase toxicológica

- **Clase IV** □ Normalmente no ofrece peligro en las condiciones normales de uso.