

Gusanos soldados y cortadores

Diversas especies



1. **Síntomas:** El principal síntoma es la defoliación de la planta. Las larvas se alimentan de las hojas y mastican desde los bordes hasta la nervadura central; también se alimentan de las espigas de los cereales. Las infestaciones grandes pueden ser muy destructivas; las larvas trepan por la planta y cortan el cuello debajo de la espiga. Se pueden encontrar especies que se alimentan sobre la superficie del suelo, otras que comen las raíces bajo tierra y otras que se alimentan dentro del tallo.
2. **Ciclo vital:** Los gusanos cortadores (arriba izquierda) y soldados adultos (abajo izquierda) son mariposillas; las hembras desovan sobre las hojas y vainas foliares cerca del suelo. Estos huevos eclosionan en unos días y al comienzo las larvas (arriba derecha, gusanos cortadores; abajo derecha, gusanos soldados) se alimentan cerca del sitio donde nacen. Durante el día se les encuentra en grietas del suelo o bajo las piedras y se alimentan en la noche o en la mañana temprano. Cuando el tiempo es húmedo, suelen alimentarse todo el día.
3. **Huéspedes/Distribución:** Las larvas generalmente son omnívoras con respecto a las gramíneas. Se encuentran especies de estos insectos en la mayoría de las zonas del mundo donde se cultivan cereales.
4. **Importancia:** Los gusanos cortadores y soldados esporádicamente causan daños considerables; cuando esto sucede, llegan a devastar grandes extensiones.

